



INSPEKCJA
WETERYNARYJNA

Kampania Informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

NIE dla ASF!

5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF*

- 1 Skutecznie zabezpiecz swoje gospodarstwo**
budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.
- 2 Ustal plan zabezpieczenia biologicznego swojego gospodarstwa uwzględniający:**
 - a) drogi komunikacyjne w gospodarstwie,
 - b) procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia oraz higieny personelu,
 - c) kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni,
oraz stale się doszkalcąj!
- 3 Pamiętaj o zabezpieczeniu i odpowiednim utrzymaniu mat / niecek dezynfekcyjnych na terenie swojego gospodarstwa.**
- 4 Przestrzegaj zakazu wstępu na teren swojego gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu.**
- 5 Stosuj zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt:**
 - a) podmiotów dostarczających paszę,
 - b) podmiotów dostarczających ściółkę,
 - c) podmiotów odbierających padlinę,
 - e) osób zatrudnionych w gospodarstwie,
 - f) osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, wizyt lekarskich itd.,
To Ty musisz dopilnować ich bioasekuracji!

*załącznik II rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. UE L 129/1).

**NIE
dla ASF
w naszych
chlewniach!**



ORGANIZATOR AKCJI:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

www.wiw.mazowsze.pl

 [WeterynariaSiedlce](https://www.facebook.com/WeterynariaSiedlce)



UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie **NIE SĄ** wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świny.

Przez „**dziki padłe**” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe, **oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika** w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- **powstrzymać się od dotykania zwłok dzika** i pozostawić je w miejscu znalezienia;
- **zgłosić fakt znalezienia padłego dzika** do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie **nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych**;
- **należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików** (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- **nie spuszczać psów ze smyczy**;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, **osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia**;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, **przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świny i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.**

Przestrzegaj Następujących Zasad Aby Chronić Gospodarstwo Przed Zawleczeniem Wirusa

- ✓ Kupuj świnie wyłącznie ze znanego źródła.
- ✓ Świnie wprowadzane do gospodarstwa muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
- ✓ Utrzymuj świnie bez możliwości kontaktu z dzikami.
- ✓ Zabezpiecz pasze i ściółkę przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
- ✓ Wyłóż maty dezynfekcyjne przed wjazdem/wyjazdem z gospodarstwa i przed wejściami do budynków inwentarskich.
- ✓ Nie karm świń odpadkami kuchennymi.
- ✓ Ogranicz do minimum ilość osób mających kontakt ze zwierzętami.
- ✓ Do pracy ze zwierzętami stosuj oddzielny strój i pozostaw go w chlewni.
- ✓ Codziennie obserwuj stan zdrowia świń.

Nie obawiaj się informować o wszelkich niepokojących objawach, jakie wystąpią w twoim stadzie.

Pamiętaj: W przypadku stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń i konieczności likwidacji stada, za każde zabite zwierzę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% wartości rynkowej.



Objawy mogące wskazywać na wystąpienie ASF

- ▲ wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 -42⁰C. - brak poprawy przy leczeniu antybiotykami;
- ▲ **UWAGA!** gorączkujące świnie mogą mieć zachowany apetyt;
- ▲ sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała
- ▲ wybroczyny w skórze;
- ▲ duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa;
- ▲ zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego;
- ▲ biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
- ▲ zwiększone upadki.



Po zaobserwowaniu ww. objawów należy:

- niezwłocznie zawiadomić lekarza weterynarii - do czasu jego przybycia pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
- nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu;
- zwłoki padłych zwierząt muszą być przekazane do zakładu utylizacyjnego -zabronione jest grzebanie padłych zwierząt czy wywożenie ich do lasu, gdyż może to spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się epizootii.